



LE JOURNAL DU STRESS HYDRIQUE DES CÔTES DU RHÔNE

2020

Numéro 3 – 29 juin 2020


Cumul de pluies en vallée du Rhône

Le cumul de pluies depuis le 1er janvier est cette extrêmement faible et record par rapport aux trente dernières années. La saison viticole a démarré sur des sols dont la complète restauration des réserves en eau est incertaine.

Cumul de pluie annuelle

Pluie cumulée du 01/01 au 31/12 (mm)
Année : 2020, maille SAFRAN n°8143. État au : 26-6-2020

Orange



— année 2020
■ 10-90^{ème} percentiles des 30 dernières années

Source : AgroMetInfo – Inrae, MétéoFrance

Déficit hydrique en vallée du Rhône – Comparaison interannuelle


Le déficit hydrique est ici calculé en faisant la somme des précipitations moins la somme de l'évapotranspiration. Cette estimation de « déficit hydrique » est basée sur des valeurs moyennes et ne prend pas en compte le paramètre sol, l'efficacité des pluies, ou les réserves potentiellement accumulées avant le 1er janvier.

Ce graphique permet cependant une comparaison avec les millésimes passés. Pour Orange, le déficit hydrique de cette année est comparable à celui de 2019 et 2017 à date égale.

Déficit hydrique en 2020

Station météo d'Orange-Caritat


- 2003
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019



Répartition géographique du déficit hydrique en vallée du Rhône


Déficit hydrique en 2020

Stations météo Gard et Ardèche




Déficit hydrique en 2020

Stations météo Vaucluse et Drôme




Les variations de déficit hydrique potentiel au sein de la région vallée du Rhône permettent d'identifier les zones potentiellement plus affectées. Ces zones ont bénéficié de moins de pluies que les autres. Le secteur de Châteauneuf-de-Gadagne notamment, a reçu moins de pluies que le reste de la vallée du Rhône.



Les zones climatiques des Côtes du Rhône

Un découpage de la vallée du Rhône en zones climatiques a été réalisé d'après les données climatiques du modèle « Aladin-Climat – RCP 2.6 », c'est-à-dire le climat par anticipation tenant compte du changement climatique (+2,6°C en 2100).

L'aire d'appellation a été découpée en trois zones de températures ; ainsi qu'en trois zones de pluviométrie pour les mois d'avril à juillet. En superposant ces deux zonages, on obtient une carte qui découpe l'aire d'appellation en 8 grandes zones à la climatologie sensiblement différente. Au sein de chaque zone une parcelle « **sentinelle** » a été sélectionnée en appellation Côtes du Rhône ou Côtes du Rhône Villages. Une parcelle sentinelle a également été retenue au sein des aires d'appellation des Crus des Côtes du Rhône suivants : Cairanne, Gigondas, Lirac, Rasteau, Tavel.



MODÈLE ALADIN-CLIMAT - SCÉNARIO RCP2.6

Le référentiel stress hydrique et ses parcelles sentinelles


L'objectif de ce référentiel de parcelles sentinelles est de pouvoir permettre l'irrigation des vignes AOC avant les signes de souffrance (défoliations, flétrissements), qui sont nuisibles à la qualité.

Les conditions pédoclimatiques de ces parcelles font qu'elles sont plus sensibles au stress hydrique que les autres. Elles montrent en général des premiers signes de stress hydrique en avance par rapport au reste du vignoble.

Suivre l'installation du stress hydrique sur ces parcelles permet **d'anticiper** l'apparition des premiers symptômes de stress hydrique sur le reste du vignoble des Côtes du Rhône. Ce suivi est principalement réalisé avec la **méthode des apex**. 


Pour chaque parcelle sentinelle, un **bilan hydrique viticole** est simulé (IFV)  en fonction des données météo locales.

Cliquez pour consulter chaque parcelle.



État de croissance de la vigne pour la parcelle de Saint-Marcel


Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020



Au 29 juin, un tiers des apex est en croissance ralentie ou arrêtée.

La contrainte hydrique est modérée.

Bilan hydrique




Le bilan hydrique indique pour les parcelles en sol médian un niveau de contrainte modéré, mais plus important qu'à la même époque en 2019.

Début juin ce secteur a reçu plus de précipitations que d'autres secteurs de la vallée du Rhône, les vignes ne souffrent pas encore.

État de croissance de la vigne pour la parcelle de Venejan


Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020



Au 29 juin, il reste moins de 15% d'apex en croissance. Les autres sont en ralentissement ou secs.

La contrainte hydrique est modérée, sur le point de passer à forte.


Bilan hydrique



Le bilan hydrique indique pour les parcelles en sol médian un niveau de contrainte fort. Les parcelles sur sol très superficiel sont en contrainte sévère.

État de croissance de la vigne pour la parcelle de Roquemaure

Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020




Au 29 juin, il ne reste plus d'apex en croissance. Plus d'un quart des apex sont secs.

La contrainte hydrique est passée au niveau « contrainte forte ».

Nous observons les premières défoliations sur cette parcelle.

Bilan hydrique




Le bilan hydrique indique pour les parcelles en sol médian un niveau de contrainte modéré, mais plus important qu'à la même époque en 2019.

Pour une parcelle située en sol très superficiel, la contrainte serait déjà forte. Les pluies de début juin n'ont pas été significatives.

État de croissance de la vigne pour la parcelle de Lirac


Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020



Au 29 juin, il reste moins d'un quart des apex en croissance.

La contrainte hydrique passe de faible à modérée.

Bilan hydrique




Le bilan hydrique indique pour les parcelles en sol médian un niveau de contrainte modéré, mais plus important qu'à la même époque en 2019. En suivant le régime hydrique de cette semaine, les parcelles en sol médian entreraient en contrainte sévère d'ici la semaine prochaine.

Pour une parcelle située en sol très superficiel, la contrainte serait déjà forte.

État de croissance de la vigne pour la parcelle de Tavel


Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020



Au 29 juin, plus des trois quarts des apex sont en ralentissement de croissance.

La contrainte hydrique est modérée.

Bilan hydrique




Le bilan hydrique indique pour les parcelles en sol médian un niveau de contrainte modéré, mais plus important qu'à la même époque en 2019.

Pour une parcelle située en sol très superficiel, la contrainte serait déjà forte.

État de croissance de la vigne pour la parcelle de Castillon-du-Gard


Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020



Au 29 juin, il n'y a presque plus d'apex en croissance.

La contrainte hydrique est sur le point de passer de modérée à forte.

Bilan hydrique



Le bilan hydrique indique pour les parcelles en sol médian un niveau de contrainte modéré, mais plus important qu'à la même époque en 2019.

En suivant le régime hydrique de cette semaine, les parcelles en sol médian entreraient en contrainte sévère d'ici la semaine prochaine.


Pour une parcelle située en sol très superficiel, la contrainte serait déjà forte.

Sur ce secteur les pluies depuis le 10 mai ne sont pas significatives.



État de croissance de la vigne pour la parcelle de Saint-Pantaléon


Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020



Au 29 juin, il n'y a presque plus d'apex en croissance.

La contrainte hydrique est sur le point de passer de modérée à forte.

Bilan hydrique




Le bilan hydrique indique pour les parcelles en sol médian un niveau de contrainte modéré, mais plus important qu'à la même époque en 2019.

Pour une parcelle située en sol très superficiel, la contrainte serait déjà forte.

État de croissance de la vigne pour la parcelle de Visan

Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020




Au 29 juin, la moitié des apex sont secs ou tombés. Ils restent peu d'apex en croissance.

La contrainte hydrique est modérée mais progresse rapidement.

Nous avons observé les premières défoliations sur cette parcelle. (photo ci-contre)



Bilan hydrique




Le bilan hydrique indique pour les parcelles en sol médian un niveau de contrainte modéré, mais plus important qu'à la même époque en 2019.

Pour une parcelle située en sol très superficiel, la contrainte serait déjà forte.

État de croissance de la vigne pour la parcelle de Cairanne


Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020



Au 29 juin, il reste moins de 10% d'apex en croissance active.

La contrainte hydrique est modérée mais sa progression est rapide et elle est sur le point de passer à forte.

Bilan hydrique




Le bilan hydrique indique pour les parcelles en sol médian un niveau de contrainte modéré, mais plus important qu'à la même époque en 2019.

Pour une parcelle située en sol très superficiel, la contrainte serait déjà forte.

État de croissance de la vigne pour la parcelle de Rasteau

Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020




Au 29 juin, il reste moins de 5% d'apex en croissance, et plus de la moitié des apex sont secs.

La contrainte hydrique est passée de modérée à forte.

Photo ci-contre : apex secs



Bilan hydrique




Le bilan hydrique indique pour les parcelles en sol médian un niveau de contrainte modéré, mais plus important qu'à la même époque en 2019.

Pour une parcelle située en sol très superficiel, la contrainte serait déjà forte.

État de croissance de la vigne pour la parcelle de Gigondas


Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020



Au 29 juin, il reste moins de 10% d'apex en croissance active.

La contrainte hydrique est modérée mais sa progression est rapide et elle est sur le point de passer à forte.

Bilan hydrique




Le bilan hydrique indique pour les parcelles en sol médian un niveau de contrainte modéré, mais plus important qu'à la même époque en 2019.

Pour une parcelle située en sol très superficiel, la contrainte serait déjà forte.

État de croissance de la vigne pour la parcelle de Plan de Dieu


Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020



Au 29 juin, la majorité des apex sont ralentis, il reste moins de 20% d'apex en croissance.

La contrainte hydrique est modérée sur le point de passer à forte.

Bilan hydrique




Le bilan hydrique indique pour les parcelles en sol médian un niveau de contrainte modéré, mais plus important qu'à la même époque en 2019.

Pour une parcelle située en sol très superficiel, la contrainte serait déjà forte.

État de croissance de la vigne pour la parcelle de Piolenc

Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020





Le 25 juin, la majorité des apex était en croissance ralentie.

La contrainte hydrique est pour le moment modérée, mais sa progression est rapide.

A date égale, le déficit hydrique est comparable à 2017.

Bilan hydrique



Le bilan hydrique indique pour les parcelles en sol médian un niveau de contrainte modéré, mais plus important qu'à la même époque en 2019.


En suivant le régime hydrique de cette semaine, les parcelles en sol médian entreraient en contrainte sévère d'ici la semaine prochaine.

Pour une parcelle située en sol très superficiel, la contrainte serait déjà forte. Sur ce secteur les pluies depuis le 10 mai ne sont pas significatives.



État de croissance de la vigne pour la parcelle de Courthézon


Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020



Au 29 juin, il reste moins de 10% d'apex en croissance.

La contrainte passe de modérée à forte.

Bilan hydrique




Le bilan hydrique indique pour les parcelles en sol médian un niveau de contrainte modéré, mais plus important qu'à la même époque en 2019.

Pour une parcelle située en sol très superficiel, la contrainte serait déjà forte.



Indice de Croissance des parcelles sentinelles


Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020



Au 29 juin 2020, l'indice de croissance de toutes les parcelles du référentiel (sauf celle de Saint-Marcel-d'Ardèche, plus arrosée) est passé sous le seuil de 0,75 à partir duquel on considère la vigne comme étant en état de stress modéré.

% Apex en pleine croissance des parcelles sentinelles


Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020



Au 29 juin, deux des parcelles suivies sont entrées en contrainte forte, mais la progression de la contrainte pour la plupart des autres parcelles est rapide, ce seuil de contrainte forte devrait être atteint dans les prochains jours.

% Apex en arrêt de croissance des parcelles sentinelles

Référentiel stress hydrique Côtes du Rhône 2020



Au 29 juin, aucune des parcelles suivies n'est en contrainte très sévère.

Bilan au 29 juin 2020

D'après les bilans hydriques, la contrainte aujourd'hui est plus forte qu'en 2019 à la même date.

Sur nos parcelles sentinelles - situées en sol plutôt superficiel - les apex sont en majorité ralentis ou secs sur tous les secteurs. La faible proportion d'apex en croissance est signe que ces parcelles sont en train de passer de l'état de contrainte modérée à contrainte forte. Nous observons les premières défoliations sur quelques parcelles. (Roquemaure, Visan).

Les prévisions météorologiques annoncent des températures élevées pendant encore au moins une semaine avec renforcement du mistral d'ici la semaine prochaine. Ces conditions risquent d'amplifier la contrainte de façon très rapide. Les bilans hydriques prévisionnels annoncent également un passage en contrainte forte pour les parcelles superficielles et médianes d'ici la semaine prochaine.

Compte tenu de ces éléments techniques, le Syndicat des Côtes du Rhône rédige une demande d'autorisation d'irriguer pour les parcelles de vignes en AOC Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Villages.

Le suivi des apex et de la croissance végétative



Apex en pleine croissance

Aspect élancé, vrilles dressées. Lorsque les deux dernières feuilles sont repliées le long de l'axe du rameau, celles-ci ne recouvrent pas l'apex



Apex en croissance ralentie

Aspect tassé, vrilles petites voire inexistantes. Lorsque les deux dernières feuilles étalées sont repliées le long de l'axe du rameau, celles-ci recouvrent l'apex



Apex à croissance arrêtée

Apex sec ou tombé de façon naturelle. Remarque : les apex coupés (écimés) ou abîmés par les frottements (vent) ne sont pas interprétables



Pour le suivi des parcelles du référentiel stress hydrique des Côtes du Rhône, nous utilisons la méthode des apex. Les données sont collectées et l'indice de croissance est calculé avec l'application **ApeX Vigne** développée par l'équipe AgriTIC de Montpellier SupAgro en partenariat avec l'Institut Français de la Vigne et du Vin et la Chambre d'Agriculture de l'Hérault.

La méthode des apex est une méthode simple pour caractériser la croissance végétative de la vigne. Elle est basée sur l'observation de l'extrémité des rameaux, que l'on appelle les apex. Elle consiste à observer une cinquantaine d'apex et les classe selon trois catégories: **pleine croissance**, **croissance ralentie** et **croissance arrêtée**.


Le calcul d'un indice synthétique appelé « **indice de croissance** » permet ensuite de caractériser la croissance végétative de la zone observée.

La réalisation hebdomadaire de ces observations permet de caractériser la **dynamique de croissance**.

Cette méthode a été développée et est utilisée depuis des années par les principaux acteurs des organisations techniques professionnelles du pourtour méditerranéen (IFV, Chambres d'Agriculture, Syndicat des CDR...). L'interprétation pour le suivi de la contrainte hydrique :

L'indice de croissance végétative varie entre 0 et 1 s'appuie sur les catégories d'apex observés sur la parcelle. Plus la valeur est forte et plus la croissance végétative est forte sur la parcelle. Il vaut 1 lorsque tous les apex sont en pleine croissance, et 0 lorsque tous les apex sont secs ou tombés.

L'intérêt principal de la méthode des apex est le suivi de la croissance végétative de la vigne. Néanmoins, dans certaines conditions, l'étude de cette croissance peut également donner des renseignements sur les phénomènes qui l'influencent. C'est par exemple le cas pour la **contrainte hydrique**. En effet, la croissance végétative des rameaux est la première fonction physiologique à être affectée par la contrainte hydrique.





Comment lire un bilan hydrique ?

Le **bilan hydrique** est une simulation du potentiel hydrique foliaire de base en fonction de données climatiques et de critères agronomiques. Il est calculé pour des parcelles « standard » (non enherbées, pas de pente...)

Le **potentiel hydrique foliaire de base** de la vigne évolue au fur et à mesure de l'installation d'un stress hydrique. C'est une mesure de pression négative, exprimée en mégapascals (Mpa). Cette mesure est l'inverse de la pression nécessaire qu'il faut appliquer sur une feuille de vigne au repos (en fin de nuit) permettant de faire remonter la sève jusqu'à l'extrémité du pétiole. La valeur obtenue donne des renseignements sur la difficulté que la vigne a à extraire l'eau du sol.

Le potentiel hydrique foliaire de base est la mesure de référence pour traduire un stress hydrique chez la vigne. Son utilisation depuis de nombreuses années a permis d'établir les seuils de stress présentés ci-contre.



Le bilan hydrique des parcelles est simulé pour plusieurs profondeurs de sols, en fonction des données météo locales (source des données : MétéoFrance). Il présente l'évolution des potentiels hydriques foliaires de base théoriques sur plusieurs types de sols

- Sol superficiel (à faible réserve en eau) RU=80 mm
- Sol standard (réserve en eau moyenne) RU=120 mm
- Sol profond (réserve en eau élevée) RU=180 mm
- Sol standard année N-1

Les plages de couleur en fond du graphique évoluent selon le stade végétatif. Elles définissent la zone dans laquelle la courbe devrait idéalement se situer en fonction de l'objectif de production (voir légende ci-contre). Le raisonnement de l'irrigation doit avoir pour objectif d'éviter que la courbe du bilan hydrique n'atteigne la zone du bas « orange foncé » qui traduit un stress important, néfaste à la qualité (flétrissements, défoliations...)

Les parcelles sentinelles suivies du référentiel stress hydrique correspondent aux modèles en sol superficiel. Le graphique propose également (courbe grise) une visualisation du même modèle au millésime précédent. Il inclut les précipitations. Une projection est proposée sur 7 jours avec pour hypothèse l'absence de pluie, en se basant sur les valeurs de température et d'évapotranspiration similaires à la semaine précédente écoulée. Chaque semaine le bilan hydrique est actualisé.

Attention, le bilan hydrique est une modélisation : c'est une estimation **théorique** du stress suivi par la vigne. Il est nécessaire de le combiner à des observations **réelles** de la vigne (apex, tensiomètres, potentiel hydrique...). Le conseiller viticole a un rôle clé pour interpréter ces données.