Les arbres

Nom commun	Genre espèce	Entités: Causses	Cévennes	Gard rhodanien	Garrigue	Costières	Camargue	Exigences pédo-climatiques: Nature du sol	Humidité	Eclairement	Tolérance au calcaire	Tolérance acidité	Résistance à la sécheresse	Résistance aux embruns	Rusticité (t°)	Intérêts: Hauteur	Feuillage	Ombrage	Parfum	Epoques et couleurs de floraison et de fructification (+): Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Utilisations: Milieu rural / urbain	Isolé	Alignement	Haie	Massif	Remarques
Acacia de Constantinople	Albizia julibrissin			+	+	+		profond			+				-10	10m																	i	a		m	A abriter du vent
Alisier blanc	Sorbus aria	+	+	+	+	+	+	filtrant			++		+	+		10m												+	+	+					h	m	Feuillage argenté
Alisier torminal	Sorbus torminalis	+	+	+	+	+		drainé			+	+	+		-15	15m												+	+	+			i		h	m	
Amandier	Prunus amygdalus				+			calcaire, sec			+		++		-10	6-8m													c	c							
Arbre aux 40 écus	Ginkgo biloba			+	+	+		profond, fertile			+		+		-5	25m																P	i				Fruits nauséabondes
Arbre de Judée	Cercis siliquastrum			+	+	+		léger			+		++	+	-10	10m																	i	a	h	m	
Aulne de Corse	Alnus cordata	+	+	+	+	+	+	profond			+	+	+	+	-20	12m																		a	h	m	Très bon brise-vent
Catalpa	Catalpa bignonoïdes		+	+	+	+		fertile			+				-20	15m			P										+	+		P	i	a			A abriter du vent
Cèdre de l'Atlas	Cedrus atlantica		+	+	+	+		filtrant			++	+	++		-20	30-40m																	i				Port pyramidal
Cèdre de l'Himalaya	Cedrus deodara		+	+	+	+		profond			++	+	++		-20	25-30m																	i				
Cerisier à grappes	Prunus padus	+	+					neutre ou légérement acide			+	+	+		-20	6-8m																					
Charme	Carpinus betulus	+	+	+		+		riche			+	+			-20	20m	A		P														i		h	m	
Charme houblon	Ostrya carpinifolia	+	+	+	+	+	+	drainé			+	+	+	+	-20	6-8m	A																i	a	h		Très bon brise-vent
Châtaignier	Castanea sativa		+					profond, drainé				+			-15	15m	A											+	+	+			i			m	
Chêne pubescent	Quercus pubescens	+	+	+	+			calcaire, sec			+		++		-15	10-15m	A																i		h	m	Spontané
Chêne vert	Quercus ilex	+	+	+	+	+	+	calcaire, sec			++		++	+	-10	10-15m																	i		h	m	Spontané
Copalme d'Amérique	Liquidambar styraciflua		+					filtrant				+		+	-15	25-40m	A																i			m	
Cyprès vert de Provence	Cupressus sempervirens			+	+	+		drainé			+	+	++		-12	15-20m																	i	a			Allergogène
Erable à feuilles d'Obier	Acer opalus	+	+	+	+			calcaire			++		++		-20	10-15m																	i	a		m	
Erable champêtre	Acer campestre	+	+	+	+			calcaire			++		+		-20	15m																		a	h		
Erable de Montpellier	Acer monspessulanum	+	+	+	+			calcaire, rocheux			++	+	++	+	-20	8-10m	A																	a	h	m	Spontané
Erable plane	Acer platanoïdes		+	+	+	+		indifférent			+		++			25m	A																i	a			
Erable sycomore	Acer pseudoplatanus		+	+	+	+		profond, frais			+		+			20-30m																P	i	a			
Eucalyptus	Eucalyptus gunii			+	+	+	+	indifférent			+		+	+	-8	25m										+	+						i	a			
Faux poivrier	Schinus molle			+	+	+	+	grossier, drainé			+	+	+	+	-5	10-15m								+				+	+	+			i		h	m	Envahissant
Févier d'Amérique	Gleditsia triacanthos		+	+	+	+		profond			+		+		-20	15-20m			P									+	+	+		P	i			m	A abriter du vent
Frêne à fleurs	Fraxinus ornus	+	+	+	+	+	+	drainé			+	+	+	+	-20	8-10m			P													P	i	a		m	
Frêne commun	Fraxinus excelsior	+	+	+			+	drainé			+		-		-20	10-25m																		a		m	
Frêne oxyphylle	Fraxinus oxyphilla			+	+	+	+	profond			+		+		-20	15-18m																		a		m	Spontané
Genévrier	Juniperus communis	+	+	+	+	+		indifférent			+	+	++	+	-20	5-10m												+	+	+						m	Spontané
Hêtre	Fagus sylvatica	+	+					drainé			+	+	+		-20	25m																	i		h	m	
If	Taxus baccata	+	+					profond			+	+	-		-20	15m																	i			m	craint la sécheresse
Jujubier	Ziziphus jujuba			+	+	+		pauvre, léger			+		++		-10	6-8m													c	c			i				
Lilas des Indes	Melia azedarach			+	+	+		indifférent			+		+		-8	6-8m				+							+	+	+	+	+		i	h	m		
Magnolia	Magnolia grandiflora		+					profond, humifère				+	-	-	-10	15m			P								+	+					i	a			
Marronnier d'Inde	Aesculus hippocastanum	+	+	+	+	+		léger et frais			+	+			-20	15-20m																	i	a	h	m	Sensible à la pollution
Mélia	Melia azedarach			+	+	+		drainé			+		+			8-12m			P											+	+		i	a			
Merisier	Prunus avium	+	+	+		+		drainé			+	+			-15	10-15m																	i		h	m	
Micocoulier de Provence	Celtis australis		+	+	+	+		drainé			+		+		-10	25m	A												+				i	a	h	m	Spontané
Mûrier à feuilles de Platane	Morus kagayamae						+	profond, bien drainé			++			+	-10	8m	A																i	a			
Mûrier à papier	Broussonetia papyrifera							profond, bien drainé			++	+	+		-10	12m	A															P	i	a			
Mûrier blanc	Morus alba		+		+			profond, bien drainé			++	+	+		-20	8-10m																	i	a		m	
Néflier du Japon	Eryobotria japonica			+	+	+		fertile, drainé			+		m			6-8m			P				c	c	c								i		m		
Noisetier (coudrier)	Corylus avellana		+	+	+	+		indifférent			+	+	+		-10	6-8m												c	c				i	h	m		
Noyer	Juglans regia		+					profond, bien drainé			+	+	-		-20	20-25m												+	+	+			i		h	m	

Olivier	Olea europaea			+	+	+		sec			+		++		-10	3-5m												c	c	c		i				
Olivier de Bohème	Elaeagnus angustifolia			+		+	+	drainé					+	+		4-8m											+	+	+				h	m		Envahissant
Orme champêtre	Ulmus resista	+	+	+		+		calcaire			+	+			-20	20-30m																i	a	h	m	
Orme de Sibérie	Zelkova carpinifolia		+					profond, drainé			+	+			-20	20-30m			P													i	a	h	m	
Palmier chanvre	Trachycarpus fortunei		+		+			riche			+	+			-15	8m																i			m	Palmier le plus rustique
Palmier nain	Chamaerops humilis			+	+	+	+	bien drainé			+	+	+		-8	3- 5m																			m	
Palmier des Canaries	Phoenix canariensis				+			riche, drainé			+	+	++		-8	8m																			m	A protéger l'hiver
Peuplier blanc	Populus alba			+		+	+	indifférent			+		-	+	-15	15-20m																		h	m	Racines traçantes
Peuplier d'Italie (noir)	Populus nigra			+		+	+	profond			+		-	+	-20	20m																		h	m	Racines traçantes
Peuplier tremble	Populus tremula			+		+	+	profond					-	+	-20	25m																		h	m	Racines traçantes
Pin d'Alep	Pinus halepensis				+	+		calcaire			+		++	+	-10	20m																i			m	Spontané
Pin maritime	Pinus maritima		+					indifférent				+		+	-15	20m																i			m	
Pin noir d'Autriche	Pinus nigra nigricans	+	+					indifférent			++		++		-15	25m																			m	Ecorce noirâtre
Pin pignon (parasol)	Pinus pinea			+	+	+	+	siliceux			+		+	+	-10	25m																i	a		m	Port en parasol
Pin sylvestre	Pinus sylvestris	+	+					siliceux			++		++		-20	30m																			m	Feuillage glauque
Platane d'Orient	Platanus orientalis	+	+	+	+	+	+	indifférent			+		+		-20	30m	A															i	a			
Robinier faux-acacia	Robinia pseudo-acacia		+	+	+	+		drainé			+	+	+		-20	10-15m																i			m	Envahissant
Savonnier	Koelreuteria paniculata		+	+	+	+		indifférent			+	+			-20	8m	A		P												P	i	a		m	A abriter du vent
Sophora du Japon	Sophora japonica		+	+	+	+		bien drainé			+	+	+		-20	15m			P												P	i	a		m	
Sorbier des oiseleurs	Sorbus aucuparia	+	+					indifférent			+	+			-20	10m	A									+	+	+				i	a	h	m	
Sorbier domestique	Sorbus domestica	+						calcaire			++				-20	15m																i	a	h	m	
Tamaris	Tamaris gallica						+	sablonneux					++	+	-15	5-8m																	h	m		
Tamaris estival	Tamaris pentandra						+	sablonneux					++	+	-15	5-8m																	h	m		
Tilleul à grandes feuilles	Tilia platyphyllos		+					drainé			+	+	+		-20	25-30m																i		h	m	
Tilleul argenté	Tilia tomentosa	+	+	+	+	+		profond			+		++		-20	25-30m			P												P	i	a		m	
Tulipier de Virginie	Liriodendron tulipifera		+					profond			+	+	-		-20	20m			P													i			m	A abriter du vent

	sec		soleil		caduc	+	fructification
	sec ou frais		soleil ou mi-ombre		persistant	c	comestible
	frais ou humide		soleil, ombre ou mi-ombre	A	intérêt automnal		

	milieu rural
	milieu rural et urbain
P	bonne résistance à la pollution